

Medikamentenkatalog „heilkundliche Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen und -sanitäter“

Ergebnis des Konsensusgespräches vom 07.06.2024 (Pyramidenprozess)

Der nachstehende Medikamentenkatalog stellt den Mindestumfang für die Medikamente dar, in denen Schülerinnen und Schüler ausgebildet und geprüft werden sollen und die von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern ggf. anhand einer vom öffentlichen Träger vorgegebenen SOP im Rahmen der Mitwirkung oder eigenverantwortlich verabreicht werden können.

Nr.	Medikament	besonderer Anwendungsbereich	beispielhafte Leitlinie
1	Epinephrin i.m.	Anaphylaxie	Leitlinien des ERC
2	Epinephrin i.v.	Reanimation, Anaphylaxie, Bradykardie	Leitlinien des ERC
3	Epinephrin inhalativ	Asthma, Anaphylaxie, Pseudokrupp	
4	Amiodaron	Reanimation, instabile Tachykardie	Leitlinien des ERC
5	Antiemetika	starke Übelkeit und Erbrechen	
6	Acetylsalicylsäure	ACS	ESC Leitlinie; Leitlinien des ERC
7	Atropin	instabile Bradykardie, Intoxikation mit Alkyphosphaten	Leitlinien des ERC
8	Benzodiazepine	(Fieber-) Krampfanfall, Status epilepticus, Sedierung, Erregungszustände	DSG / DGN
9	Betablocker	Herzrhythmusstörungen, ACS	
10	Beta ₂ -Sympathomimetika	Asthma, COPD, Bronchitis	
11	Ipratropiumbromid	Asthma, COPD, Bronchitis	
12	Butylscopolamin	Koliken	
13	Furosemid	Lungenödem	
14	Glucose	Hypoglykämie	
15	Glukagon	Hypoglykämie - Alternativmedikament zur Glukose	
16	H ₁ -Blocker	Allergische Reaktion	Leitlinien des ERC
17	Heparin	ACS, LAE, art. Verschluss	
18	Ibuprofen	Antipyrese, Analgesie	
19	Paracetamol	Antipyrese, Analgesie	
20	Es-/ Ketamin	Analgesierung	
21	Glukokortikoide	Asthma, COPD, Allergische Reaktion	
22	Kristalloide Infusion (balancierte VEL)	Volumenersatz, Medikamententräger	
23	Lidocain	Antiarrhythmikum bei defibrillierbaren Rhythmen; Hinweis: keine Anwendung beim i.o. Zugang	Leitlinien des ERC
24	Naloxon	Opioid-Intoxikation	Leitlinien des ERC
25	Nitrate	ACS, Lungenödem	ECS, Leitlinien des ERC
26	Opioide	Analgesie	
27	Sauerstoff		
28	Tranexamsäure	schwere, nicht komprimierbare Blutung, hämorrhagischer Schock nach schwerer Blutung	S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletzen-Behandlung
29	Urapidil	Hypertonie mit Endorganschäden	